

Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego

Analiza minimalizacji kosztów



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

maciej.niewada@healthquest.pl

[Redacted]

kontakt@healthquest.pl

[Redacted]

[Redacted]

biuro@berlin-chemie.com

www.berlin-chemie.pl

[Redacted]

E-mail: mgamrot@berlin-chemie.com

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Spis treści

1	Streszczenie	3
	Słowa kluczowe	4
	Spis treści	5
2	Cel pracy	6
3	Uzasadnienie kliniczne	7
4	Populacja	9
5	Strategia i technika analityczna	9
6	Perspektywa	9
7	Horyzont czasowy analizy	9
8	Parametry analizy	10
	8.1 Koszt nabycia substancji czynnych	10
9	Wyniki	13
	9.1 Koszty leczenia z perspektywy płatnika	13
	9.2 Koszty leczenia z perspektywy pacjenta.....	13
	9.3 Koszty leczenia z perspektywy połączonej (NFZ i pacjenta).....	14
10	Analiza wrażliwości	16
11	Ograniczenia	16
12	Dyskusja	17
13	Podsumowanie	19
14	Aneks	20
	14.1 Dane kosztowe.....	20
	14.2 Skuteczność i bezpieczeństwo terapii	24
	14.3 Metodyka przeglądu systematycznego analiz ekonomicznych	28
15	Spis tabel	32
16	Spis rysunków	33
17	Piśmiennictwo	34

Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
- analiza minimalizacji kosztów

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted]			[Redacted]			[Redacted]		
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



*Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
- analiza minimalizacji kosztów*

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]									[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
- analiza minimalizacji kosztów

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]


[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
 – analiza minimalizacji kosztów



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

*Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
- analiza minimalizacji kosztów*

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

* Oszacowanie niezamieszczone, wykonane na tych samych zasadach i z tymi samymi założeniami jak analiza podstawowa.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]


Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
- analiza minimalizacji kosztów

■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■

[redacted]

■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■
■	[redacted]	■

[Redacted text block]



15 Spis tabel

Tab. 1. Charakterystyka problemu decyzyjnego według schematu PICO.	■
Tab. 2 Struktura udziału w rynku leków z grupy pochodnych dihydropirydyny.....	■
Tab. 3 Dawkowanie lerkaniidypiny i amlodypiny.....	■
Tab. 4 Kalkulacja ceny detalicznej preparatu Primacor®, wydatków refundacyjnych NFZ oraz kosztu DDD (na podstawie ceny ex-factory zadeklarowanej przez producenta na potrzeby refundacji).....	■
Tab. 5 Oszacowanie średnich dopłat NFZ oraz pacjenta do DDD oraz rocznej terapii amlodypiną refundowaną w Polsce oraz lerkaniidypiną (produkt leczniczy Primacor®).....	■
Tab. 6 Cena zbytu netto opakowania lerkaniidypiny, przy której koszt terapii porównywanymi lekami jest taki sam.	■
Tab. 7 Oszacowanie średnich dopłat NFZ oraz pacjenta do DDD i rocznej terapii produktem leczniczym Primacor® dla obu opakowań osobno a także dla amlodypiny refundowanej w Polsce.....	■
Tab. 8 Preparaty amlodypiny refundowane w Polsce: ceny detaliczne, limity, dopłaty NFZ i pacjentów.....	■
Tab. 9 Zmiana obecnie obowiązującej (z lipca 2012) ceny detalicznej, limitu oraz dopłaty świadczeniobiorcy względem wartości z marca 2012.....	■
Tab. 10 Podsumowanie skuteczności leczenia lerkaniidypiną w porównaniu z amlodypiną.....	■
Tab. 11 Podsumowanie bezpieczeństwa lerkaniidypiny w porównaniu z amlodypiną.....	■
Tab. 12 Strategia wyszukiwania analiz ekonomicznych dotyczących lerkaniidypiny w bazie MEDLINE (Ovid), na dzień 06.08.2012.	■
Tab. 13 Strategia wyszukiwania analiz ekonomicznych dotyczących lerkaniidypiny w bazie EMBASE (Elsevier), na dzień 06.08.2012.	■
Tab. 14 Strategia wyszukiwania analiz ekonomicznych dotyczących lerkaniidypiny w bazie Cochrane, na dzień 06.08.2012	■

16 Spis rysunków

Ryc. 1 Roczny koszt terapii lerkanidypiną i amlodypiną.....	■
Ryc. 2 Schemat kolejnych etapów wyszukiwania i selekcji analiz ekonomicznych dotyczących lerkanidypiny (diagram QUOROM).....	■

17 Piśmiennictwo

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text] http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C08CA

11 [Redacted text]

[Redacted text] <http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4756> [Redacted text]

13 [Redacted text] (PSzyperski@berlin-chemie.com) [Redacted text]

14 [Redacted text]

*Lerkanidypina (Primacor®) w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego
– analiza minimalizacji kosztów*

15

